



डॉ. बालासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली

आजपर्यंत विद्यापीठांनी संयुक्त कृषि संशोधन व
विकास समितीद्वारे संशोधन शिफारशी केलेले पिकनिहाय तंत्रज्ञान

पीक व वाण	:	भेंडी															
शिफारशींचा तपशिल (वर्षनिहाय)	:	वर्ष - २००९															
लागवडीविषयी तंत्रज्ञान व शिफारशी	:	जांभ्या जमिनीत हिवाळयात भेंडी पिकापासून अधिक उत्पादन व नफा मिळविण्यासाठी पिकाची पेरणी पांढ-या पॉलीथीन कापडाच्या अच्छादनाचा वापर करून डिसेंबरच्या दुस-या आठवडयात करावी व पिकास ७ ते ९ दिवसाच्या अंतराने एकूण १३ पाण्याच्या पाळ्या देऊन प्रत्येक पाळीच्या वेळी ५० मि.मि. पाणी द्यावे.															
शिफारशींचा तपशिल (वर्षनिहाय)	:	वर्ष - २०१८															
पीक व्यवस्थापनाबद्दल इतर शिफारशी	:	उन्हाळी भेंडी पिकापासून अधिक उत्पादन व फायदेशीर मिळकतीसाठी कोकण विभागातील जांभ्या जमिनीत प्लास्टीक अस्तरीकरणाचा वापर आणि १२०-४५ × १५ सेमी अंतराने जोड ओळीत लागवड करून खालील प्रमाणे ठिबक सिंचनाद्वारे दररोज पाणी द्यावे व शिफारशीत मात्रेनुसार (१००:५०:५० किलो नत्र:स्फुरदःपालाश/हे) विद्राव्य खताचा आठवड्याच्या अंतराने सात समान हप्त्यात (०.३७५ किलो १९:१९:१९ आणि युरिया ०.१५५ किलो/हे) वापर करावा अशी शिफारस करण्यात येत आहे.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>पीकाच्या वाढीचा कालावधी (आठवडा)</th> <th>पाण्याची मात्रा (ली./मी लांबी)</th> <th>एकूण दिलेले पाणी (मिमी/हे)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१ ते ५</td> <td>५२</td> <td>६५.४</td> </tr> <tr> <td>६ ते ९</td> <td>५०</td> <td>६२.८</td> </tr> <tr> <td>१० ते १३</td> <td>७५</td> <td>९४.२</td> </tr> <tr> <td>१४ ते १७</td> <td>४७</td> <td>५८.६</td> </tr> </tbody> </table>			पीकाच्या वाढीचा कालावधी (आठवडा)	पाण्याची मात्रा (ली./मी लांबी)	एकूण दिलेले पाणी (मिमी/हे)	१ ते ५	५२	६५.४	६ ते ९	५०	६२.८	१० ते १३	७५	९४.२	१४ ते १७	४७	५८.६
पीकाच्या वाढीचा कालावधी (आठवडा)	पाण्याची मात्रा (ली./मी लांबी)	एकूण दिलेले पाणी (मिमी/हे)															
१ ते ५	५२	६५.४															
६ ते ९	५०	६२.८															
१० ते १३	७५	९४.२															
१४ ते १७	४७	५८.६															