



अंक ३६/२०१८

दिनांक ०४/०५/२०१८

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,
विभाग प्रमुख,
कृषिविद्या विभाग
९४२२४३१०६७

डॉ. विजय मोरे,
नोडल ऑफिसर,
कृषिविद्या विभाग
९४२२३७४००९

प्रा. विरेश चव्हाण,
तांत्रिक अधिकारी,
कृषिविद्या विभाग
९४२२०६५३४४

मागील हवामान सांशे	
दि. ३०/०४/२०१८ ते ०४/०५/२०१८	
पाऊस (मिमी)	: ०.०
पाऊस (मिमी) १/१/१८ पासून	: ०.०
पाऊस (मिमी) (गेल्या वर्षी)	: ३६३३.५
कमाल तापमान (अं.से)	: ३२.५—३३.०
किमान तापमान (अं.से)	: १२.०—२२.०
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ()	: ९०—९५
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ()	: ६९—७२
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	: ४.३—५.४

हवामान पूर्वानुमान (०५/०५/२०१८ सकाळी ८:३० पासून ०९/०५/२०१८ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)						
हवामानाचे घटक	:	०५/०५	०६/०५	०७/०५	०८/०५	०९/०५
पाऊस (मिमी)	:	०	०	०	०	०
कमाल तापमान (अं.से)	:	३३	३३	३३	३४	३४
किमान तापमान (अं.से)	:	२५	२५	२६	२६	२६
मेघाच्छादन (ऑक्टा)	:	१	२	३	२	२
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ()	:	९०	९२	८९	८६	८८
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ()	:	६०	६५	६३	६७	६७
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	:	००६	००३	००३	००५	००९
वाच्याची दिशा	:	नै.प.	नै.द.	नै.द.	नै.द.	नै.प.

हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला:

दिनांक ५ ते ९ मे, २०१८ पर्यंत अवकाश अंशतः मेघाच्छादित राहिल. दिनांक ५ ते ९ मे, २०१८ पर्यंत वाच्याचा वेग ३ ते ९ किमी प्रति तास राहिल.

पिक	पिक अवस्था	कृषि सल्ला
भात	—	● खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी जमिनीची नांगरट करून जमिन उन्हात तापू द्यावी.
भुईमूळ	शेंगा धरणे	● बाप्पीभवनामध्ये वाढ होत असल्याने भुईमूळ पिकाला ६ ते ८ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे.
कडधान्य पिके	काढणी	● तयार झालेल्या कडधान्य पिकाळी सकाळी काढणी करून उन्हात व्यवस्थित वाळवावे. वाळलेली पिकांची संरक्षित ठिकाणी साठवण करावी.
आंबा, काजू	फलधारणा आणि फले काढणी	<ul style="list-style-type: none"> ● आंबा फलांवर फलमाशीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, फलमाशीच्या नियंत्रणासाठी आंबा बागेत विद्यापीठाने शिफारस केलेले हेक्टरी ४ या प्रमाणात रक्षक फलमाशी सापले लावावेत. ● आंब्यामध्ये मोठ्या आकाराची काढणीची फले तयार झाली असून ती काढणीच्या अवस्थेत आहेत. तयार फले सकाळी दहाच्या अगोदर व दुपारच्या नंतर झेल्याच्या सहाय्यान ८० ते ८५ टक्के पकवतेला काढावीत. काढलेली फले साका टाळण्यासाठी व उण्णतेपासून बचाव करण्यासाठी सावलीत ठेवावीत. ● काजू पश्चात बुरशीजन्य रोगापासून आंबा फलांचे संरक्षण करण्यासाठी काढणीनंतर लगेचव फले ५२° सें.अं. तापमानाच्या पाण्यात १० मिनिटे बुडवून काढावीत आणि नंतर सावलीत वाळवावीत. काढलेली तयार फले पिकवण्यासाठी ती ६.५ मिली इंथ्रेल १० लिटर पाणी या द्रावणात ५ मिनिटे बुडवून नंतर सावलीत वाळवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठानी शिफारस केलेले कोरेगोटेड फायबर बॉक्सच्या सहाय्याने आब फलांची पैकिंग करावी. शक्यतो आंब्याची वाहतूक रात्रीच्यावेळी करावी. फले काढणीच्या किमान ८ दिवस अगोदर झाडावर कोणतेही औषध फवारू नये. ● काजू झाडावरील रोठा या किडीच्या नियंत्रणासाठी रोठाच्या अळ्या १५ मि. मी. आकाराच्या पटाशीच्या सहाय्याने काढून टाकाव्यात व क्लारोपायरीफॉस (२० टक्के प्रवाही) १० मि. लि. प्रति लिटर या प्रमाणात द्रावण तयार करून प्रादुर्भाव भाग त्या द्रावणाने चांगला भिजवावा व उरलेले द्रावण झाडाच्या बुंधालगत मुळाशी ओतावे. ● काजू बी तयार झालेली आहे. तयार झालेल्या बीयांची काढणी करून ती उन्हामध्ये योग्यप्रकारे वाळवावी. ● विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे काजू बोंडापासून विविध टिकावू पद्धत तयार करावेत. ● नवीन फलबाग लागवड करण्यासाठी फलपिकांच्या शिफारस अंतरानुसार खड्डे खोदून तयार करावेत.
नारळ/ सुपारी	—	<ul style="list-style-type: none"> ● सरासरी तापमानात वाढ झाल्यामुळे नारळाच्या बागेला ५ ते ६ दिवसांनी आणि सुपारी बागेला ४ ते ५ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. ● नारळावरील गेंडाभुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी बागेमध्ये शेणखताच्या खुद्यात दर दोन महिन्यांनी मिथील पैरंथिअॉन २ टक्के भुक्टी मिसलावी. ● नारळावरील सोंडया भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी खोडावर १ मिटर उंचीवर गिरमिटाच्या सहाय्याने १५ ते २० सें.मी. खोल तिरपे भोक पाडून त्यामध्ये २० टक्के प्रवाही क्लोरोपायरीफॉस नरसळ्याच्या सहाय्याने ओतावे आणि भोक सिमेट्या सहाय्याने बंद करावे.
भाजीपाला लागवड		<ul style="list-style-type: none"> ● भाजीपाला (वारंगी, टोमॅटो, मिर्ची व नवलकोल) पिकांमध्ये भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी ५ टक्के हेक्टाकोनझाल ५ मिली किंवा ८० टक्के पाण्यात मिसळणारी गंधक २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारावे. ● वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांमध्ये फलमाशीच्या नियंत्रणासाठी प्रति हेक्टर ४ रक्षक सापले लावावेत.
दुधती जनावरे/ शेळ्या/ कुकुटपालन	—	<ul style="list-style-type: none"> ● जनावराना पाणी पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच गोठायामधे हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी. ● जनावरांना हिरव्या चान्यासाठी झुऱ्यपवर्गीय व बहुवर्गीय वैरणीच्या पिकांची लागवड करावी. ● दुधत्या जनावरांना १ ते १.५ किलो खुराक, १५ ते २० किलो हिरवी वैरणी व ४ ते ५ किलो वाळलेली वैरणी घ्यावी. ● सर्वसाधारण एका शेळीस ३-४ किलो हिरवा चारा, २ ते २.५ किलो वाळलेला चारा व ३०० ग्रॅम खुराक प्रतिदिन दयावा. ● जनावरांने उण्णतेपासून योग्यते संरक्षण करावे. गोठायामध्ये व शेडमध्ये हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी तसेच जनावरांना सावलीत वांधावे. ● ब्रॉयलर पक्षांना पहिले तीन आठवडे त्यांच्या वजनानुसार ब्रॉयलर स्टार्टर व पुढे म्हणजेच चार-सहा आठवडयांपर्यंत ब्रॉयलर फिनीशर खाद्य घ्यावी. ● पोल्ट्री शेळच्या छपावर वाळलेले गवताचे अच्छादन करावे व शेडच्याभावेती गोणापाठ बांधून ओले करावे. जनावरांना सावलीत वांधावे
सुचना	—	<ul style="list-style-type: none"> ● निरनिराळे किडी, रोग जास्त प्रमाणात आढळल्यास नजिकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.