



प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
हवामानावर आधारीत कृषि सल्ला (रत्नागिरी जिल्हा)



अंक ३/२०१९

(०२३५८) २८२३८७

दिनांक ०८/०१/२०१९

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,
विभाग प्रमुख,
कृषिविद्या विभाग
९४२२४३१०६७

डॉ. विजय मोरे,
नोडल ऑफिसर,
कृषिविद्या विभाग
९४२२३७४००१

डॉ. शितल यादव,
तांत्रिक अधिकारी
कृषिविद्या विभाग
८३७९९०११६०

मागील हवामान आठवडा सारांश (दिनांक ०२/०१/२०१९ ते ०८/०१/२०१९)							हवामानाचे घटक	हवामान पूर्वानुमान (दिनांक ०९/०१/२०१९ सकाळी ८:३० पासून १३/०१/२०१९ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)				
०२/०१	०३/०१	०४/०१	०५/०१	०६/०१	०७/०१	०८/०१		०९/०१	१०/०१	११/०१	१२/०१	१३/०१
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	पाऊस (मिमी)	०	०	०	०	०
३२.६	३२.५	३३.०	३४.०	३२.२	३२.४	३३.०	कमाल तापमान (अं.से)	३४	३३	३३	३३	३३
९.०	१०.०	१०.०	११.०	११.०	११.०	१०.५	किमान तापमान (अं.से)	१७	१६	१६	१७	१७
३	०	०	०	०	०	०	मेघाच्छादन (ऑक्ट)	०	०	०	०	१
८८	९२	९५	९०	९०	९०	९५	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता	४९	४८	४५	५१	५२
६५	६०	५८	६०	५९	६०	-	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता	३४	३५	३५	३४	३४
०.२	-	-	-	-	-	-	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	६	८	६	६	६
शांत	शांत	शांत	शांत	शांत	शांत	शांत	वाऱ्याची दिशा	ई. पू.	ई. पू.	पू.	ई. पू.	ई. पू.
पाऊस (मिमी) मागील आठवडयातील							पाऊस (मिमी) ११/२०१८ पासून आजपर्यंत	पाऊस (मिमी) गेल्या वर्षीचा				
०.०							०.०	३०६१.८				

हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला

दिनांक ९ ते १३ जानेवारी २०१९ पर्यंत कमाल व किमान तापमानात साधारण राहिल तसेच आद्रता कमी होण्याची शक्यता आहे.

पिक	अवस्था	कृषि सल्ला
भात	रोप अवस्था	• उन्हाळी भात रोपवाटीकेस नियमित पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.
वाल	फुलोरा अवस्था	• कमी होणारी आद्रता तसेच पिक फुलोऱ्यात येण्याची व दाणे भरण्याची अवस्था ओलाव्यासाठी अति सवेदनशील असल्याने वाल पिकास फुलोऱ्याच्या काळात व शेंगा भरताना पाणी व्यवस्थापन करावे.
भुईमुग	वाढीची अवस्था	• भुईमुग पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
आंबा	मोहोर अवस्था	• आंबा पिकामध्ये मोहोर संरक्षण वेळापत्रकानुसार तिसरी फवारणी मोहोर फुलण्यापूर्वी इमिडाक्लोप्रॉड १७.८ टक्के प्रवाही ३ मि. ली. ६ मि. ली. प्रति १० पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. त्यामुळे तुडतुडे तसेच मिजमाशीचे नियंत्रण होवू शकेल व त्याचा परपरागीकरण करणाऱ्या कीटकावर होणारा परिणाम टाळता येईल. तसेच फवारणीच्या वेळेस कितकनाशकाच्या द्रावणामध्ये भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी ५ टक्के हेक्झाकोनॅझोल ५ मि. ली. किंवा पाण्यात विरघळणारे ८० टक्के गंधक २० ग्रॅम प्रति १० लिटर या प्रमाणात वापरावे.
भाजीपाला/ फळबाग रोपवाटिका	फलधारणा	• टोमॅटो, वांगी, पिकावर शेंडा व फळे पोखरणान्या अळीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास किडग्रस्त फांद्या व फळे जमा करून नष्ट करावीत व फेनव्हलरेट १० मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका डॉ. बाळासाहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा