



प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
हवामानावर आधारीत कृषि सल्ला (ठाणे पालघर जिल्हा)

(०२३५८) २८२३८७



अंक ५५/२०१८

दिनांक १०/०७/२०१८

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,
विभाग प्रमुख,
कृषिविद्या विभाग
९४२२४३१०६७

डॉ. विजय मोरे,
नोडल ऑफिसर,
कृषिविद्या विभाग
९४२२३७४००१

प्रा. विरेश चव्हाण,
तांत्रिक अधिकारी,
कृषिविद्या विभाग
९४२२०६५३८४

मागील हवामान आठवडा सारांश	
दि. ०६/०७/२०१८ ते १०/०७/२०१८	
पाऊस (मिमी)	: ०.०
पाऊस (मिमी) १/१/१८ पासून	: ०.०
पाऊस (मिमी) (गेल्या वर्षी)	: २८२४.२
कमाल तापमान (अं.से)	: ३२.५—३७.०
किमान तापमान (अं.से)	: २२.५—२७.८
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	: ७६—८२
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	: ५७—६८
वाञ्याचा वेग (किमी/तास)	: ३.३—५.०

हवामान पूर्वानुमान (११/०७/२०१८ सकाळी ८:३० पासून १५/०७/२०१८ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)						
हवामानाचे घटक	:	११/०७	१२/०७	१३/०७	१४/०७	१५/०७
पाऊस (मिमी)	:	१५०	८३	९०	८८	७४
कमाल तापमान (अं.से)	:	२७	२८	२८	२८	२८
किमान तापमान (अं.से)	:	२४	२४	२५	२५	२५
मेघाच्छादन (ऑक्टा)	:	८	८	८	८	८
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	९५	९४	९४	९४	९४
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	९३	९३	९२	९२	९२
वाञ्याचा वेग (किमी/तास)	:	००५	००७	००९	००८	०११
वाञ्याची दिशा	:	नै.प.	नै.द.	नै.द.	नै.द.	नै.प.

हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला:

दिनांक ११ ते १५ जुलै, २०१८ पर्यंत पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ११ ते १५ जुलै, २०१८ पर्यंत अवकाश मेघाच्छादन राहिल. दिनांक ११ ते १५ जुलै, २०१८ पर्यंत वाञ्याचा वेग ५ ते ११ किमी प्रति तास राहिल.

पिक	पिक अवस्था	कृषि सल्ला
भात	पुर्वतयारी	<ul style="list-style-type: none"> रोपवाटिकेत जास्त पाण्याचा निचरा करावा. चिखळीच्या वेळी ४० किलो नन्हा, ५० किलो स्फुरद आणि ५० किलो पालाया प्रती हेक्टर खताची मात्रा द्यावी. भाताच्या रोपांची लावणी २० X १५ सें. मी. अंतर ठेवून करावी. लावणी सरळ आणि उथळ (२.५ ते ३.५ सें. मी. खोल) करावी. उथळ लावणी केल्याने फुटवे चांगले येतात. एका चुडात तीन रोपे लावावीत सकरित भातासाठी एकच रोप लावावे. बांधावरील खेकडयांचा बंदोबस्त करावा त्यासाठी १ किलो शिजलेल्या भातामध्ये ७५ टक्के पा.मि. ऑसिफेट पावडर ७५ ग्रॅम किंवा पा.मि. कार्बारिल भूकटी १०० ग्रॅम टाकून विशरी अमिष तयार करावे. या मिश्रणाच्या साधारणपणे १०० गोळ्या तयार करून प्रत्येक बिळाच्या आत तोंडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे, दुसऱ्या दिवशी जी बीळे उकरली जातील अशा विवात परत अमिष वापरावे. रोप वाटिकेतील रोपे जर १२ ते १५ सें. मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेली २२ ते २५ दिवसांची झाली असतील तर भात पिकाची पुरुलागण सुरु करावी.
चिकू	लागवड व बागेची निगा	<ul style="list-style-type: none"> चिकू लागवडीसाठी १० X १० मीटर अंतरावर १ X १ X १ मीटर आकाराचे खड्डे खणून ते चांगली मात्री आणि ३—४ घमेले शेणखत, २ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि वाळवीच्या नियंत्रणासाठी भूंगा १०० ग्रॅ. फॉलीडॉल पावडर किंवा ५० ग्रॅम दाणेदार क्लोरोफायरीफॉस या मिश्रणाने भरून ठेवावेत. चिकूची फळगळ रोखण्यासाठी मेटॅलॅक्स ५८ टक्के + मॅन्कोझैब ६५ टक्के यांची ०.२ टक्के या प्रमाणात फळधारणा सुरु होताना फवारणी करावी. पावसाळ्यात ०.२ टक्के या प्रमाणात चिकटणाऱ्या पदार्थाचा वापर करावा. यापुढील फवारण्या एक महिन्यात अंतराने घ्याव्यात आणि एकूण तीन फवारण्या घ्याव्यात.
नारळ/ सुपारी	—	<ul style="list-style-type: none"> नारळावरील गेंडाभुंगा या किढीच्या नियंत्रणासाठी बागेच्यामध्ये शेणखताच्या खड्ड्यात दर दोन महिन्यांनी कार्बारील पावडरचे (१० लिटर पाण्यात २० ग्रॅम) मिश्रण तयार करून फवारावे. नारळावरील सोंडया भुंगा या किढीच्या नियंत्रणासाठी भूंगा या किढीच्या नियंत्रणासाठी भूंग्यानी पाडलेली भोके १० टक्के कार्बारील भूकटी व बाळूने बुजवून घ्यावीत. तसेच खोडावर १ मिटर उंचीवर गिरमियाच्या सहाय्याने १५ ते २० सें.मी. खोल तिरपे भोके पाडून त्यामध्ये २० मिली ३६ टक्के प्रवाही मोनोक्रोटोफॉस किंवा २० टक्के प्रवाही क्लोरोपायरीफॉस नरसळ्याच्या सहाय्याने ओतावे आणि भोके सिमेटच्या सहाय्याने बंद करावे. तीन वर्षावरील प्रत्येक सुपारीच्या झाडास १ घमेले शेणखत किंवा कंपोस्ट खत. १२ किलो हिरवळीचे खत. १६० ग्रॅम युरिया. ५०० ग्रॅम सिंगल सुपर फॉस्फेट. १२५ ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटेश खत द्यावे. नारळ आणि सुपारी बागेत पावसाचे अतिरक्त पाण्याचा निचरा होणेसाठी चर खोदून घ्यावेत. <p><u>टिप:</u>— पावसाची तिव्रता कमी असताना खते द्यावी.</p>
भाजीपाला आणि फळबाग रोपवाटीका	—	<ul style="list-style-type: none"> वेलवर्गीय भाजीयांना काठीचा आधार द्यावा. भाजीपाला क्षेत्रातील तणाचा बंदोबस्त करावा. तसेच प्रती गुंठ क्षेत्रास ७२० ते ८५० ग्रॅम युरिया खताचा एक तृतीयांश हप्ता द्यावा अणि मंडपाची व्यवस्था करावी. . रोपवाटिकेतील पाण्याचा निचरा होणेसाठी चर खोदून घ्यावेत. आंबा बाढा कलमे १० ते १२ जूलै पूर्वी बांधून पूर्ण करावीत म्हणजे कलमे जगण्याचे प्रमाण चांगले राहिल.
दुभती जनावरे/ शेळ्या/ कुकुरपालन	—	<ul style="list-style-type: none"> जनावराना पाणी पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच गोठायामध्ये हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी. जनावरांना हिरव्या चाच्यासाठी बुडूपवारीय व बहुवरीय वैरणीच्या पिकांची लागवड करावी. दुभत्या जनावरांना १ ते १.५ किलो खुराक, १५ ते २० किलो हिरवी वैरण व ४ ते ५ किलो वाळलेली वैरणी द्यावी. सर्वसाधारण एका शेळीस ३—४ किलो हिरवा चाचा, २ ते २.५ किलो वाळलेला चाचा व ३०० ग्रॅम खुराक प्रतिदिन द्यावा. जनावराचे येणाऱ्या पावसापासून योग्यते संरक्षण करावे. वांधवे. ब्रॉयलर पक्षांना पहिले तीन आठवडे त्यांच्या वजनावसार ब्रॉयलर स्टार्टर व पुढे म्हणजेच चार—सहा आठवडयांपर्यंत ब्रॉयलर फिनीशर खाद्य द्यावे.
सुचना	—	<ul style="list-style-type: none"> निरनिराळे किडी, रोग जास्त प्रमाणात आढळल्यास नजिकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.