



प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
हवामानावर आधारीत कृषि सल्ला (ठाणे व पालघर जिल्हा)



(०२३५८) २८२३८७

अंक ८४/२०१८

दिनांक १९/१०/२०१८

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,
विभाग प्रमुख,
कृषिविद्या विभाग
९४२२४३१०६७

डॉ. विजय मोरे,
नोडल ऑफिसर,
कृषिविद्या विभाग
९४२२३७४००१

डॉ. शितल यादव,
तांत्रिक अधिकारी
कृषिविद्या विभाग
८३७९९०११६०

मागील हवामान आठवडा सारांश (दिनांक १४/१०/२०१८ ते १८/१०/२०१८)					हवामानाचे घटक	हवामान पूर्वानुमान (दिनांक १९/१०/२०१८ सकाळी ८:३० पासून २३/१०/२०१८ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)				
१४/१०	१५/१०	१६/१०	१७/१०	१८/१०		१९/१०	२०/१०	२१/१०	२२/१०	२३/१०
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	पाऊस (मिमी)	४	०	५	१०	६
३६.०	३५.६	३६.४	३६.४	३२.८	कमाल तापमान (अं.से)	३४	३५	३५	३६	३६
२१.४	२१.६	२१.८	२२.०	२४.४	किमान तापमान (अं.से)	२६	२५	२४	२४	२४
०	०	०	२	०	मेघाच्छादन (ऑक्ट)	२	२	४	३	२
९१	८७	७४	८७	९२	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता	८६	८५	८५	८६	८६
६१	४०	५०	७०	६४	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता	६६	६७	६८	६८	६८
१.७	१.६	१.७	२.०	१.७	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	५	६	५	६	६
-	-	-	-	-	वाऱ्याची दिशा	ई.	ई.	पू.	पू.	ई.पू.
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील					पाऊस (मिमी) १९/१०/१८ पासून आजपर्यंत	पाऊस (मिमी) गेल्या वर्षीचा				
०.०					२३५९.६	२८३४.२				

हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला

दिनांक १९ व २१ ते २३ ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंत हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आकाश अंशतः मेघाच्छादित राहील.

पिक	अवस्था	कृषि सल्ला
भात	पक्वता	<ul style="list-style-type: none"> पुढील पाचही दिवस मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने तयार झालेल्या भात पिकाची सकाळी 'वैभव' विळ्याने जमिनीलगत कापणी करून लगेच मळणी करून २ ते ३ उन्हे देऊन धान्य वाळवावे. खोडकिडीचा प्रादुर्भाव असल्याने शेतातील भात पिकाच्या काढणी नंतर धसकटे गोळा करून नष्ट करावीत.
नागली	पक्वता	<ul style="list-style-type: none"> पावसाची शक्यता असल्याने तयार झालेल्या नागली पिकाची कणसे सकाळी कणसे विळ्याने कापून उन्हात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी.
वाल	पूर्व मशागत व पेरणी	<ul style="list-style-type: none"> भात कापणी नंतर जमिनीच्या अंगओल्यावर विनामशागत वालाची पेरणी करण्यासाठी भात काढणीनंतर लगेच शेतातील तणांचे ग्लायफोसेट ५ मि. ली. प्रति लिटर पाण्यातून फवारणी करावी. त्यानंतर कोणतीही मशागत न करता टोकन पद्धतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अंतर ठेवून वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते वेळी बियाण्याशेजारी भोक करून त्यामध्ये दाणेदार मिश्रखत गुठ्यास एक किलो या प्रमाणे द्यावेत.
आंबा	पालवी	<ul style="list-style-type: none"> आंब्याच्या नवीन फुटलेल्या पालवीवर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास नियंत्रणासाठी डेल्टामेथ्रीन २.८ टक्के प्रवाही ९ मि. ली. किंवा मोनोक्रोटोफॉस ३६ टक्के प्रवाही १५ मि. ली. प्रति १० लि. पाण्यातून कलमावर फवारावे. ढगाळ वातावरणामुळे आंब्यावरील पालवीवर भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असल्याने रोगाच्या नियंत्रणासाठी पाण्यात विरघळणारे ८० टक्के गंधक २० ग्रम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
नारळ	फलधारणा	<ul style="list-style-type: none"> नारळा वरील सोंड्या भुंग्याच्या नियंत्रणासाठी शक्य असतील तेवढ्या अक्या कोयतीच्या सहाय्याने काढून टाकाव्यात तसेच खोडावर १ मीटर उंचीवर गिरमीटाच्या सहाय्याने १५ ते २० से.मी. खोल तिरपे भोक पाडून त्यामध्ये २० मि.ली. ३६ टक्के मोनोक्रोटोफॉस प्रवाही कीटकनाशक नरसाळ्याच्या सहाय्याने ओतावे आणि भोक सिमेंटच्या सहाय्याने बंद करावे.
केळी	लागवड	<ul style="list-style-type: none"> केळी पिकाच्या नवीन लागवडीसाठी ४५ x ४५ x ४५ से.मी. आकाराचे खड्डे खणावेत आणि उंच वाढणाऱ्या जातीसाठी ३ x ३ मी., मध्यम वाढणाऱ्या जातीसाठी २.५ x २.५ मी. व ठेगण्या जातीसाठी २ x २ मी. अंतरावर लागवड करावी. लागवडीच्या वेळेस ५ किलो शेणखत, ६०० ग्रम सिंगल सुपर फोस्फेट आणि २०० ग्रम म्युरेट ऑफ पोटश खताची मात्र द्यावी.
मसाला पिके	आंतरमशागत	<ul style="list-style-type: none"> मसाला पिक बागांची गवत काढून लवकरात लवकर साफसफाई करावी तसेच ७ ते ८ दिवसांच्या अंतराने पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.
चिक्	फलधारणा	<ul style="list-style-type: none"> चिक् बागेतील किडग्रस्त तसेच गळलेली सर्व फळे गोळा करून जाळून नष्ट करावीत आणि बाग स्वच्छ ठेवावी. चिक् बागेमध्ये जुन्या झाडांची मुख्य फांदीची छाटणी व इतर फांद्यांची विरळणी करावी.
फुलशेती	रोपवाटिका	<ul style="list-style-type: none"> झेंडू व अस्टर फुलपिकांची रोपवाटिका तयार करावीत. मोगरा फुलपिकावर कळी पोखरण्या अळीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास किडीच्या नियंत्रणासाठी ५% निबोळी अर्काची फवारणी करावी.
भाजीपाला/ फळबाग रोपवाटिका	रोपवाटिका	<ul style="list-style-type: none"> रब्बी भाजीपाला रोपवाटीकेतील रोपांच्या जोमदार वाढीसाठी पेरणीनंतर १५ दिवसांनी प्रत्येक वाफ्यास ५० ग्रम युरियाची मात्र द्यावी. पालेभाज्या, भेंडी व कलिंगडाची लागवड १५ नोव्हेंबर पूर्वी पूर्ण करून घ्यावी. वांगी वर्गीय व कोबीवर्गीय पिकांची रोपवाटिका तयार करावीत. भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाटीकेस नियमित पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.
दुभती जनावरे/ शेळ्या/ कुकुटपालन	-	<ul style="list-style-type: none"> उपलब्ध असलेल्या हिरवा चान्याची मुरघास पद्धतीने साठवण करावी. वाढत्या उष्णतेमुळे संकरीत जनावरे दुपारच्या वेळेस चरायला सोडू नयेत. जनावरांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच गोठ्यामध्ये हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा.

