



(०२३५८) २८२३८७

अंक ५०/२०१८

दिनांक २२/०६/२०१८

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,
विभाग प्रमुख,
कृषिविद्या विभाग
९४२२४३१०६७

डॉ. विजय मोरे,
नोडल ऑफिसर,
कृषिविद्या विभाग
९४२२३७४००१

प्रा. विरेश चव्हाण,
तांत्रिक अधिकारी,
कृषिविद्या विभाग
९४२२०६५३४४

मागील हवामान आठवडा सारांश		
दि. १८/०६/२०१८ ते २२/०६/२०१८		
पाऊस (मिमी)	:	०.०
पाऊस (मिमी) १/१/१८ पासून	:	०.०
पाऊस (मिमी) (गेल्या वर्षी)	:	२८२४.२
कमाल तापमान (अं.से)	:	३२.५—३७.०
किमान तापमान (अं.से)	:	२२.५—२७.८
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	७६—८२
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	५७—६८
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	:	३.३—५.०

हवामान पूर्वानुमान (२३/०६/२०१८ सकाळी ८:३० पासून २७/०६/२०१८ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)						
हवामानांचे घटक	:	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६
पाऊस (मिमी)	:	१०	१२	६	६९	७०
कमाल तापमान (अं.से)	:	३२	३२	३३	३२	३१
किमान तापमान (अं.से)	:	२६	२६	२५	२५	२५
मेघाच्छादन (ऑक्टा)	:	८	७	६	८	८
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	८०	८०	७९	८०	७८
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	७२	७२	७१	७२	७३
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	:	००४	००५	००६	००७	००७
वाच्याची दिशा	:	नै.प.	नै.द.	नै.द.	नै.द.	नै.प.

हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला:

दिनांक २३ ते २७ जून, २०१८ पर्यंत पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २३ ते २७ जून, २०१८ पर्यंत अवकाश मेघाच्छादित राहिल. दिनांक २३ ते २७ जून, २०१८ पर्यंत वाच्याचा वेग ६ ते ८ किमी प्रति तास राहिल.

पिक	पिक अवस्था	कृषि सल्ला
भात	पुर्वतयारी	<ul style="list-style-type: none"> भात क्षेत्रातील बांधांची बाध.बंदीस्ती करावी. भात पिकाची पुनर्लागण (लावणी) करण्याकरिता खरीप हंगामात (पावसाळी) १२ ते १५ सें. मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेली २२ ते २५ दिवसांची रोपे लावणीसाठी वापरावीत. चिखळ्यांच्या वेळी ४० किलो नव्र, ५० किलो स्फुरद आणि ५० किलो पालाया प्रती हेक्टर खताची मात्रा घावी. भाताच्या रोपांची लावणी २० X १५ सें. मी. अंतर ठेवून करावी. लावणी सरळ आणि उथळ (२.५ ते ३.५ सें. मी. खोल) करावी. उथळ लावणी केल्याने फुटवे चांगले येतात. एका चुडात तीन रोपे लावावीत संकरित भातासाठी एका ठिकाणी एकच रोप लावावे. बांधावरील खेकडयांचा बंदोबस्त करावा त्यासाठी १ किलो शिजलेल्या भातामध्ये ७५ टक्के पामि. अॅसिफेट पावडर ७५ ग्रॅम किंवा पामि. कार्बरिल भूकटी १०० ग्रॅम टाकून विषारी अभिष तयार करावे. या मिश्रणाच्या साधारणपणे १०० गोळया तयार करून प्रत्येक बिळाच्या आत तोंडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे, दुसऱ्या दिवशी जी बीळ उकरली जातील अशा बिळात परत अभिष वापरावे.
चिकू	फलधारणा	<ul style="list-style-type: none"> चिकू लागवडीसाठी १० X १० मीटर अंतगवर १ X १ X १ मीटर आकाशाचे खड्डे खण्ने ते चांगली माती आणि ३—४ घमेले शेणखत, २ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि वाळवीच्या नियंत्रणासाठी १०० ग्रॅ. फॉलीडॉल पावडर किंवा ५० ग्रॅम दाणेदार क्लोरोफायरीफॉस या मिश्रणाने भरून ठेवावेत.
नारळ/ सुपारी	—	<ul style="list-style-type: none"> नारळावरील गेंडाभुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी बागेमध्ये शेणखताच्या खड्ड्यात दर दोन महिन्यांनी कार्बरील पावडरचे (१० लिटर पाण्यात २० ग्रॅम) मिश्रण तयार करून फवारावे. नारळावरील सोंडया भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी भुंग्यानी पाडलेली भोके १० टक्के कार्बरील भुकटी व बाळूने बुजवून घ्यावीत. तसेच खोडावर १ मिटर उंचीवर गिरमिटाच्या सहाय्याने १५ ते २० सें.मी. खोल तिरपे भोके पाडून त्यामध्ये २० मिली ३६ टक्के प्रवाही मोनोक्रोटोफॉस किंवा २० टक्के प्रवाही क्लोरोपायरीफॉस नरसळ्याच्या सहाय्याने ओतावे आणि भोके सिमेट्या सहाय्याने बंद करावे. तीन वर्षावरील प्रत्येक सुपारीच्या झाडास १ घमेल शेणखत किंवा कंपोस्ट खत. १२ किलो हिरवळीचे खत, १६० ग्रॅम युरिया, ५०० ग्रॅम सिंगल सुपर फॉस्फेट, १२५ ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटेंश खत घावे. नारळ आणि सुपारी बागेत पावसाचे अतिरक्त पाण्याचा निचरा होणेसाठी चर खोदून घ्यावेत.
भाजीपाला आणि फलाबाग रोपवाटीका	—	<ul style="list-style-type: none"> वेलवर्गीय भाज्यांना काठीचा आधार घावा. भाजीपाला क्षेत्रातील तणांचा बंदोबस्त करावा. तसेच प्रती गुंठ क्षेत्रास ७२० ते ८५० ग्रॅम युरिया खताचा एक तृतीयांश हप्ता घावा अणि मंडपाची व्यवस्था करावी. . आंबा कलमे तयार करण्यासाठी आवश्यक आंबा बाठायाची पेरणी करावी. रोपवाटीकेतील पाण्याचा निचरा होणेसाठी चर खोदून घ्यावेत. आंबा वाढा कलमे १० ते १२ जूलै पूर्वी बांधून पूर्ण करावीत म्हणजे कलमे जगण्याचे प्रमाण चांगले राहिल.
दुभती जनावरे/ शेळ्या/ कुकुरपालन	—	<ul style="list-style-type: none"> जनावराना पाणी पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच गोठायामधे हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी. जनावराना हिरव्या चान्यासाठी शुद्धपवर्णीय व बहुवर्षीय वैरणीच्या पिकांची लागवड करावी. दुभत्या जनावराना १ ते १.५ किलो खुराक, १५ ते २० किलो हिरवी वैरण व ४ ते ५ किलो वाळलेली वैरणी घावी. सर्वसाधारण एका शेळीस ३—४ किलो हिरवा चारा, २ ते २.५ किलो वाळलेला चारा व ३०० ग्रॅम खुराक प्रतिदिन दयावा. जनावरांचे येणाऱ्या पावसापासून योग्यते संरक्षण करावे. वांधावे. ब्रॉयलर पक्षांना पहिले तीन आठवडे त्यांच्या वजनानुसार ब्रॉयलर स्टार्टर व पुढे म्हणजेच चार—सहा आठवडयांपर्यंत ब्रॉयलर फिनीशर खादा घावे.
सुचना	—	<ul style="list-style-type: none"> निरनिगळे किडी, रोग जास्त प्रमाणात आढळल्यास नजिकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.