



अंक ३३/२०१८

दिनांक २४/०४/२०१८

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,  
विभाग प्रमुख,  
कृषिविद्या विभाग  
९४२२४३१०६७

डॉ. विजय मोरे,  
नोडल ऑफिसर,  
कृषिविद्या विभाग  
९४२२३७४००९

प्रा. विरेश चव्हाण,  
तांत्रिक अधिकारी,  
कृषिविद्या विभाग  
९४२२०६५३४४

मागील हवामान सारांश	
दि. २०/०४/२०१८ ते २४/०४/२०१८	
पाऊस (मिमी)	: ०.०
पाऊस (मिमी) १/१/१८ पासून	: ०.०
पाऊस (मिमी) (गेल्या वर्षी)	: ३६३३.५
कमाल तापमान (अं.से)	: ३३.२-३५.२
किमान तापमान (अं.से)	: १७.५-२१.०
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ()	: ८१-९५
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ()	: ६२-७०
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	: ४.४-६.०

हवामान पूर्वानुमान (२५/०४/२०१८ सकाळी ८:३० पासून २९/०४/२०१८ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)						
हवामानाचे घटक	:	२५/०४	२६/०४	२७/०४	२८/०४	२९/०४
पाऊस (मिमी)	:	०	०	०	०	०
कमाल तापमान (अं.से)	:	३४	३३	३३	३३	३३
किमान तापमान (अं.से)	:	२५	२४	२४	२४	२६
मेघाच्छादन (ऑक्टा)	:	१	१	०	०	०
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ()	:	८१	७६	८३	८९	९३
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ()	:	२९	३३	३२	३८	३९
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	:	००८	००९	००८	००८	००८
वाच्याची दिशा	:	नै.प.	नै.द.	नै.द.	नै.द.	नै.प.

### हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला:

दिनांक २५ व २६ एप्रिल २०१८ रोजी अवकाश अंशतः मेघाच्छादित राहिल. दिनांक २५ ते २९ एप्रिल, २०१८ पर्यंत वाच्याचा वेग ८ ते ९ किमी प्रति तास राहिल. आहे.

पिक	पिक अवस्था	कृषि सल्ला
भुईमूग	शेंगा धरणे	● बाष्णीभवनामध्ये वाढ होत असल्याने भुईमूग पिकाळा ६ ते ८ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे.
कडधान्य पिके	काढणी	● तयार झालेल्या कडधान्य पिकाळी आणि संध्याकाळी काढणी करून उन्हात व्यवस्थित वाळवावे. वाळलेली पिकाळी संरक्षित ठिकाणी साठवण करावी.
आंबा, काजू	फलधारणा आणि फले काढणी	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आंबा फलांवर फलमाशीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, फलमाशीन्या नियंत्रणासाठी आंबा बागेत विद्यापीठाने शिफारस केलेले हेक्टरी ४ या प्रमाणात रक्षक फलमाशी सापेळे लावावेत.</li> <li>● आंब्यामध्ये मोठ्या आकाराची काढणीची फले तयार झाली असून ती काढणीच्या अवस्थेत आहेत. तयार फले सकाळी तहाच्या आगोदर व दुपारी चारच्या नंतर झेल्याच्या सहाय्यान ८० ते ८५ टक्के पकवतेला काढावीत. काढलेली फले साका टाळण्यासाठी व उण्ठातेपासून बचाव करण्यासाठी सावलीत ठेवावीत.</li> <li>● काढणी पश्चात बुरशीजन्य रोगापासून आंबा फलांचे संरक्षण करण्यासाठी काढणीनंतर लगेचव फले ५२° सें.अं. तापमानाच्या पाण्यात १० मिनिटे बुडवून काढावीत आणि नंतर सावलीत वाळवावीत. काढलेली तयार फले पिकवण्यासाठी ती ६.५ मि.ली इंथ्रेल १० लिटर पाणी या द्रावणात ५ मिनिटे बुडवून नंतर सावलीत वाळवावीत. डॉ. बालासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाने शिफारस केलेले कोरोगोरेड फायबर बॉक्सच्या सहाय्याने आंब फलांची पैकिंग करावी. शक्यतो आंब्याची वाहतूक रात्रीच्यावेळी करावी. फले काढणीन्या किमान ८ दिवस अगोदर झाडावर कोणतेही औषध फवारू नये.</li> <li>● काजू झाडावरील रोठा या किडीच्या नियंत्रणासाठी रोठयाच्या अळ्या १५ मि. मी. आकाराच्या पटाशीच्या सहाय्याने काढून टकाव्यात व क्लोरोपायरीफॉस (२० टक्के प्रवाही) १० मि.लि. प्रति लिटर या प्रमाणात द्रावण तयार करून प्रादुर्भाव भाग त्या द्रावणाने चांगला भिजवावा व उरलेले द्रावण झाडाच्या बुंध्यालगत मुळाशी ओतावे.</li> <li>● काजू बी तयार झालेली आहे. तयार झालेल्या बीयांची काढणी करून ती उन्हामध्ये योग्यप्रकारे वाळवावी.</li> <li>● विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे काजू बोंडापासून विविध टिकावू पदार्थ तयार करावेत.</li> </ul>
नारळ/सुपारी	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सरासरी तापमानात वाढ झाल्यामुळे नारळाच्या बागेला ५ ते ६ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे.</li> <li>● नारळावरील गेंडाभुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी बागेमध्ये शेणुखात्या खुद्यात दर दोन महिन्यांनी मिथील पैरेथिअॅन २ टक्के भुक्टी मिसळावी.</li> <li>● नारळावरील सॉंडया भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी खोडावर १ मिटर उंचीवर गिरमिटाच्या सहाय्याने १५ ते २० सें.मी. खोल तिरपे भोक पाडून त्यामध्ये २० टक्के प्रवाही क्लोरोपायरीफॉस नरसळ्याच्या सहाय्याने ओतावे आणि भोक सिमेंट्या सहाय्याने बंद करावे.</li> </ul>
भाजीपाला लागवड		<ul style="list-style-type: none"> <li>● भाजीपाला (वारंगी, टोमॅटो, मिरची व नवलकोल) पिकांमध्ये भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी ५ टक्के हेक्टारोनेश्नोल ५ मिली किंवा ८० टक्के पाण्यात मिसळणारी गंधक २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवाशवे.</li> <li>● वेलवर्गीय भाजीपाला पिकामध्ये फलमाशीन्या नियंत्रणासाठी प्रति हेक्टर ४ रक्षक सापेळे लावावेत.</li> </ul>
दुभती जनावरे/शेळ्या/कुकुटपालन	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जनावराना पाणी पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच गोठायामधे हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी.</li> <li>● जनावरांना हिरव्या चान्यासाठी झुऱ्यपर्गीय व बहुवर्षीय वैरणीच्या पिकांची लागवड करावी.</li> <li>● दुभत्या जनावरांना १ ते १.५ किलो खुराक, १५ ते २० किलो हिरवी वैरण व ४ ते ५ किलो वाळलेली वैरणी घ्यावी.</li> <li>● सर्वसाधारण एका शेळीस ३-४ किलो हिरवा चारा, २ ते २.५ किलो वाळलेला चारा व ३०० ग्रॅम खुराक प्रतिदिन दयावा.</li> <li>● जनावरांने उण्ठातेपासून योग्यते संरक्षण करावे. गोठायामध्ये हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी.</li> <li>● ब्रॉयलर पक्षांना पहिले तीन आठवडे त्यांच्या बजनानुसार ब्रॉयलर स्टार्टर व पुढे म्हणजेच चार-सहा आठवड्यांपर्यंत ब्रॉयलर फिनीशर खाद्य घ्यावे.</li> <li>● दिवसाचे कमाल तापमान वाढत असल्याने कोंबड्याचे उण्ठातेपासून संरक्षण करावे.</li> </ul>
सुचना	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>● निरनिराळे किडी, रोग जास्त प्रमाणात आढळल्यास नजिकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.</li> </ul>