



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबदल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

अनु. क्र.	तपशिल	सविस्तर माहिती
१.	पीक/वाणाचे नाव	भुईमूग- कोकण गौरव
२.	प्रसारित केल्याचे वर्ष	१९९३
३.	प्रसारित करणारी संस्था/विद्यापीठ	डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
४.	जमीन	मध्यम व उताराची तांबडी जमीन
५.	हवामान	कोकण विभाग
६.	पेरणी/लागवडीचा कालावधी	बियाणे पेरणी (खरीप) जुन-जुलै आणि (रब्बी) नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करावी.
७.	प्रती एकर बियाणे	४० ते ४४ किलो/एकर
८.	पीक व्यवस्थापन	<p>१.लागवडीचे /पेरणीचे व्यवस्थापन : सपाट वाफ्यांवर निमपसरी जाती ४५ X १५ सेमी अंतरावर पेरावे.</p> <p>२.खत व्यवस्थापन : हेक्टरी १० टन शेणखत द्यावे. पेरणीवेळी पिकास ५० किलो नत्र + १०० किलो स्फुरद द्यावे.</p> <p>३.पाणी व्यवस्थापन : रब्बी हंगामात पिकाच्या वाढीच्यावेळी पाणी द्यावे.</p> <p>४.किड व्यवस्थापन : मावा- डायमथोएट १० मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.</p> <p>५.रोग व्यवस्थापन : टिक्का-कार्बनडॅंझिम ५०० ग्रॅम प्रती ५०० लिटर पाण्यातून फवारावे.</p>
९.	पिकाचा कालावधी	१२० ते १३० दिवस
१०.	उत्पादकता	१८ ते २० क्विंटल प्रती हेक्टर.
११.	वाणाची वैशिष्ट्ये/ विशेष गुणधर्म	निमपसरी, एकामागोमाग फुलोरा आणि गडद हिरवी पाने.

१२. वाणासंबंधी छायाचित्रे



अनु. क्र.	तपशिल	सविस्तर माहिती
१.	पीक/वाणाचे नाव	भुईमूग- कोकण ट्रॉम्बे टपोरा (टिकेजी बोल्ड)
२.	प्रसारित केल्याचे वर्ष	१९९३
३.	प्रसारित करणारी संस्था/विद्यापीठ	डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
४.	जमीन	पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी उताराची तांबडी जमीन
५.	हवामान	कोकण विभाग, महाराष्ट्र राज्य
६.	पेरणी/लागवडीचा कालावधी	बियाणे पेरणी (खरीप) जून-जुलै आणि (रब्बी) नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडयापासून जानेवारीच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत पूर्ण करावी.
७.	प्रती एकर बियाणे	४० ते ४४ किलो/एकर
८.	पीक व्यवस्थापन	<p>१.लागवडीचे /पेरणीचे व्यवस्थापन : सपाट वाफ्यांवर निमपसरी जाती ४५ X १५ सेमी अंतरावर पेरावे.</p> <p>२.खत व्यवस्थापन : हेक्टरी १० टन शेणखत द्यावे. पेरणीवेळी पिकास ५० किलो नत्र + १०० किलो स्फुरद द्यावे.</p> <p>३.पाणी व्यवस्थापन : रब्बी हंगामात पिकाच्या वाढीच्यावेळी पाणी द्यावे.</p> <p>४.किड व्यवस्थापन : मावा- डायमथोएट १० मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.</p> <p>५.रोग व्यवस्थापन : टिक्का-कार्बनडॅंझिम ५०० ग्रॅम प्रती ५०० लिटर पाण्यातून फवारावे.</p>
९.	पिकाचा कालावधी	१२० दिवस
१०.	उत्पादकता	२० ते २२ क्विंटल प्रती हेक्टर.
११.	वाणाची वैशिष्ट्ये/ विशेष गुणधर्म	स्पानीश झुडूप, बुटकी (७० ते ८० सेमी उंची), गडद हिरवी पाने, मोठा दाणा खाण्यासाठी योग्य
१२.	वाणासंबंधी छायाचित्रे	