



हवामानावर आधारित कृषि सल्ला (ठाणे जिल्हा)
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, दापोली आणि प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र,
मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने)



(०२३५८) २८२३८७

अंक ५०/२०२०

दिनांक २३/०६/२०२०

कालावधी ५ दिवस

डॉ. प्रशांत बोडके,
विभाग प्रमुख,
कृषिविदया विभाग
९४२०४१३२५५

डॉ. विजय मोरे,
नोडल ऑफिसर,
कृषिविदया विभाग
९४२२३७४००९

डॉ. शितल यादव,
तांत्रिक अधिकारी
कृषिविदया विभाग
८३७९९०११६०

मागील हवामान आठवडा सारांश (दिनांक १७/०६/२०२० ते २३/०६/२०२०)							हवामानाचे घटक	हवामान पूर्वानुमान (दिनांक २४/०६/२०१९ सकाळी ८:३० पासून २८/०६/२०२० सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)				
१७/०६	१८/०६	१९/०६	२०/०६	२१/०६	२२/०६	२३/०६		२४/०६	२५/०६	२६/०६	२७/०६	२८/०६
-	१.०	७७.६	०.०	२.०	३०.०	-	पाऊस (मिमी)	२७	१५	१४	२५	३५
-	३४.२	३३.०	३३.६	३४.२	३४.८	-	कमाल तापमान (अं.से)	३४	३३	३३	३३	३२
-	२४.२	२५.०	-	२४.६	२५.०	-	किमान तापमान (अं.से)	२४	२४	२५	२५	२५
-	३	६	४	४	६	-	मेघाच्छादन (ऑक्टा)	८	५	७	७	७
-	८१	८३	-	७८	८६	-	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता	९२	९३	९२	९२	९३
-	७४	६९	७०	७६	७९	-	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता	८३	७५	७५	७७	७६
-	०.०	०.०	३.७	०.०	०.०	-	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	९	१०	१०	१०	८
-	शांत	शांत	आ.	शांत	शांत	-	वाऱ्याची दिशा	द.	द.	द.	द.	द.

हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला

दिनांक २४ ते २८ जून, २०२० दरम्यान बहुतांश ठिकाणी मध्यम पाऊसाची शक्यता आहे.

पिक	अवस्था	कृषि सल्ला
खरीप भात	रोपवाटिका	<ul style="list-style-type: none"> पेरणीनंतर १५ दिवसांनी प्रति गुंठा क्षेत्रास १ कि.ग्रॅ. युरिया खताचा दुसरा हप्ता देण्यात यावा. बांधावरील खेकड्यांच्या नियंत्रणासाठी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला सलग २ ते ३ रात्री बांधावरील खेकडे बतीच्या उजेडात पकडून त्यांची संख्या कमी करावी आणि नंतर विषारी आमिषाचा वापर करून खेकड्यांचे नियंत्रण करावे. १ किलो शिजलेल्या भातामध्ये ७५ टक्के पाण्यात मिसळणारी अॅसिफेट पावडर ७५ ग्रॅम टाकून विषारी अमिष तयार करावे. या मिश्रणाच्या साधारणपणे १०० गोळ्या तयार करून प्रत्येक बिळाच्या आत तोंडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे, दुसऱ्या दिवशी जी बिळे उकरली जातील अशा बिळात परत आमिष वापरावे. विषारी आमिषाचा वापर सांघिकरीत्या व एकाच वेळी केल्यास खेकड्यांचे नियंत्रण करण्यास मदत होईल. (सूचना: सदर कीटकनाशकास लेबल क्लेम नाही).
नागली	रोपवाटीका	<ul style="list-style-type: none"> पेरणीनंतर १५ दिवसांनी प्रति गुंठा क्षेत्रास १ कि.ग्रॅ. युरिया खताचा दुसरा हप्ता देण्यात यावा.
भेंडी	लागवड	<ul style="list-style-type: none"> भेंडी पिकाची लागवड सरी पद्धतीने ६० x ६० सें.मी. अंतरावर करावी. लागवडीच्या वेळेस प्रती एकरी ६ टन चांगले कुजलेले शेणखत, २९ किलो युरिया, १२५ किलो सिंगल सुपर फोस्फेट आणि ३३ किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश खताची मात्रा द्यावी.
वेलवर्गीय भाजीपाला	वाढीची अवस्था	<ul style="list-style-type: none"> वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांना काठीचा आधार द्यावा किंवा मंडपाची व्यवस्था करावी.

टिप: पाऊसाची तीव्रता कमी असताना कीटकनाशकाच्या आणि बुरशीनाशकाच्या फवारण्या कराव्यात तसेच पाऊसात द्रावण पानांवर चिकटून राहण्यासाठी फवारणीच्या द्रावणात स्टिकर मिसळून फवारणी करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका डॉ. बाळासाहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा