



प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली  
हवामानावर आधारित कृषि सल्ला (रत्नागिरी जिल्हा)  
(०२३५८) २८२३८७



अंक ७९/२०१७

दिनांक ०३/१०/२०१७

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,  
विभाग प्रमुख,  
कृषिविद्या विभाग  
९४२२४३१०६७

डॉ. ज्ञानेश्वर जगताप,  
नोडल ऑफिसर,  
कृषिविद्या विभाग  
९४०३९८८१४३

प्रा. विरेश चव्हाण,  
तांत्रिक अधिकारी,  
कृषिविद्या विभाग  
९४२२०६५३४४

मागील हवामान सारांश दि. २९/०९/२०१७ ते ०३/१०/२०१७	
पाऊस (मिमी)	: १५.५
पाऊस (मिमी) १/१/१७ पासून	: ३४८२.५
पाऊस (मिमी) (रोल्या वर्षी)	: ४५०४.१
कमाल तापमान (अं.से)	: २९.६-३१.०
किमान तापमान (अं.से)	: २२.५-२३.८
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	: ९३-९८
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	: ८१-८५
वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	: २.५-३.६

हवामान पूर्वानुमान (०४/१०/२०१७ सकाळी ८:३० पासून ०८/१०/२०१७ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)						
हवामानाचे घटक	:	०४/१०	०५/१०	०६/१०	०७/१०	०८/१०
पाऊस (मिमी)	:	६६	१२	०	४	४
कमाल तापमान (अं.से)	:	३१	३०	३०	३०	३०
किमान तापमान (अं.से)	:	२३	२२	२२	२२	२२
मेघाच्छादन (ऑक्ट)	:	७	६	७	८	८
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	८६	८४	८६	८६	८७
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	७३	६८	६२	६६	७४
वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	:	००८	००६	००६	००८	०१४
वाऱ्याची दिशा	:	नै.प.	नै.द.	नै.द.	नै.द.	नै.प.

**हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला:**

दिनांक ४, ५ व ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पावसाची शक्यता आहे. दिनांक ४ ते ८ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत अवकाश मेघाच्छादित राहिल. दिनांक ४ ते ८ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत वाऱ्याचा वेग ६ ते १४ किमी प्रति तास राहिल.

पिक	पिक अवस्था	कृषि सल्ला
भात	लॉंब्या भरणे आणि परिपक्वता	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुढील दोन दिवसात पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यामुळे तयार झालेल्या हळव्या भात जातीची कापणी पुढे ढकलावी.</li> </ul>
आंबा, काजू	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>आंबा आणि काजू बागेतील गवताच्या नियंत्रणासाठी गवताची कापणी विळ्याच्या/गवत कापणी यंत्राच्या सहाय्याने करावी किंवा ग्लायफोसेट तणनाशक ३ ते ४ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून त्याची फवारणी गवतावर करावी.</li> <li>टिप - तणनाशकाची फवारणी केलेल्या बागेत जनावरे चरवीण्यासाठी सोडू नये.</li> </ul>
नारळ/सुपारी	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>नारळावरील गेंडाभुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी बागेमध्ये शेणखताच्या खड्ड्यात दर दोन महिन्यांनी कार्बारील पावडरचे (१० लिटर पाण्यात २० ग्रॅम) मिश्रण तयार करून फवारावे.</li> <li>नारळावरील सोंडया भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी भुंग्यानी पाडलेली भोके १० टक्के कार्बारील भुकटी व वाळूने बुजवून घ्यावीत. तसेच खोडावर १ मिटर उंचीवर गिरमिटाच्या सहाय्याने १५ ते २० सें.मी. खोल तिरपे भोक पाडून त्यामध्ये २० मिली ३६ टक्के प्रवाही मोनोक्रोटोफॉस किंवा २० टक्के प्रवाही क्लोरोपायरीफॉस नरसळ्याच्या सहाय्याने ओतावे आणि भोक सिमेंटच्या सहाय्याने बंद करावे.</li> </ul>
भाजीपाला लागवड	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>भाजीपाला क्षेत्रातील तणांचा बंदोबस्त करावा.</li> <li>पडवळ, घोसाळी, शिराळी इत्यादी फळीभाज्यांवर फळमाशीचा प्रादूर्भाव होण्याची शक्यता आहे, त्याच्या नियंत्रणासाठी "रक्षक" सापळे प्रति हेक्टर ४ नग लावावेत.</li> </ul>
दुभती जनावरे/शेळ्या	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>जनावरांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करावी.</li> </ul>
सुचना	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>निरनिराळे किडी, रोग जास्त प्रमाणात आढळल्यास नजिकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.</li> </ul>