



प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली  
हवामानावर आधारीत कृषि सल्ला (रत्नगिरी जिल्हा)  
(०२३५८) २८२३८७



अंक ७७/२०१७

दिनांक २६/०९/२०१७

कालावधी ५ दिवस

डॉ. सुभाष चव्हाण,  
विभाग प्रमुख,  
कृषिविद्या विभाग  
९४२२४३१०६७

डॉ. ज्ञानेश्वर जगताप,  
नोडल ऑफिसर,  
कृषिविद्या विभाग  
९४०३९८८१४३

प्रा. विरेश चव्हाण,  
तांत्रिक अधिकारी,  
कृषिविद्या विभाग  
९४२२०६५३४४

मासिल हवामान सारांश	
दि. २२/०९/२०१७ ते २६/०९/२०१७	
पाऊस (मिमी)	: ११७.८
पाऊस (मिमी) १/१/१७ पासून	: ३४४२.८
पाऊस (मिमी) (गेल्या वर्षी)	: ४५०४.१
कमाल तापमान (अं.से)	: २४.८-३१.०
किमान तापमान (अं.से)	: २१.५-२२.२
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	: ९०-९६
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	: ७९-८४
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	: १.७-३.९

हवामान पूर्वानुमान (२७/०९/२०१७ सकाळी ८:३० पासून ०१/१०/२०१७ सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)						
हवामानाचे घटक	:	२७/०९	२८/०९	२९/०९	३०/०९	०१/१०
पाऊस (मिमी)	:	४	२०	२२	२०	६
कमाल तापमान (अं.से)	:	३१	३२	३२	३२	३२
किमान तापमान (अं.से)	:	२४	२४	२४	२४	२४
मेघाच्छादन (ऑक्टो)	:	६	७	७	८	७
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	८६	८७	८६	८५	८४
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	:	७४	७५	७४	७४	७३
वाच्याचा वेग (किमी/तास)	:	०१५	०१३	०१७	०१६	०१८
वाच्याची दिशा	:	नै.प.	नै.द.	नै.द.	नै.द.	नै.प.

## हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला:

दिनांक २७ सप्टेंबर ते ०१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत पावसाची शक्यता आहे, दिनांक २७ सप्टेंबर ते ०१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत अवकाश मेघाच्छादित राहिल. दिनांक २७ सप्टेंबर ते ०१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत वाच्याचा वेग १३६ ते १८ किमी प्रति तास राहिल.

पिक	पिक अवस्था	कृषि सल्ला
भात	लोंब्या येणे	<ul style="list-style-type: none"> <li>गर्व्या भात पिकाला खताचा तिसरा हता पीक फुलेच्यात असताना हेक्टरी २० किलो नव्र (लवणीनंतर ७० ते ८० दिवसांनी) खताची मात्रा द्यावी सदर खत मात्रा पावसाची अडीप असताना द्यावी.</li> <li>भात पिकावर निळे भुगेरे या किडीचा प्रातुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, प्रातुर्भाव दिसून येताच त्याच्या नियंत्रणासाठी क्युनॉलफॉस २५ टक्के प्रवाही २ लिटर किंवा ट्रायड्योफॉस ४० टक्के प्रवाही ६२५ मिली किंवा लॅमडासायहॅलेन ५ टक्के २५० मिली यापैकी एक किटक्नाशक ५०० लिटर पाण्यात मिसळून १ हेक्टर शेतकर फवारावे.</li> <li>भातावरील बुरशीजन्य करणा गेगाच्या व्यवस्थापनासाठी ट्रायसायलेंझोल (७५ टक्के प्रवाही मिसळणारी भुकटी) १० लिटर पाण्यात १० ग्रॅम किंवा आयसेप्रोथिझॉलेन (४० टक्के प्रवाही) १० लिटर पाण्यात १० मिली यापैकी एका बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.</li> </ul>
आंबा, काजू	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>आंबा आणि काजू बागेतील गवताच्या नियंत्रणासाठी गवताची कापणी विळयाच्या/गवत कापणी यंत्राच्या सहाय्याने करावी किंवा ग्लायफोसेट तणनाशक ३ ते ४ मिली प्रती लिटर पाण्यात मिसळून त्याची फवारणी गवतावर करावी. <u>टिप</u> — तणनाशकाची फवारणी केलेल्या बागेत जनावरे चरवीण्यासाठी सोडू नये.</li> </ul>
नारळ/सुपारी	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>नारळावरील गेंडाभुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी बागेमध्ये शेणुखताच्या खड्डुयात दर दोन महिन्यांनी काबरील पावडरचे (१० लिटर पाण्यात २० ग्रॅम) मिश्रण तयार करून फवारावे.</li> <li>नारळावरील सोंड्या भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी भुंग्यानी पाडलेली भोके १० टक्के काबरील भुकटी व वाळूने बुजवून घ्यावीत. तसेच खोडावर १ मिटर उंचीवर गिरमिटाच्या सहाय्याने १५ ते २० सें.मी. खोल तिरपे भोक पाडून त्यामध्ये २० मिली ३६ टक्के प्रवाही मोनोक्रोटोफॉस किंवा २० टक्के प्रवाही क्लोरोपायरीफॉस नरसळयाच्या सहाय्याने ओतावे आणि भोक सिमेट्या सहाय्याने बंद करावे.</li> <li>नारळ आणि सुपारी बागेत पावसाचे अतिरक्त पाण्याचा निचरा होणेसाठी चर खोदून घ्यावेत.</li> </ul>
भाजीपाला लागवड		<ul style="list-style-type: none"> <li>भाजीपाला शेत्रातील तणांचा बंदोबस्त करावा.</li> <li>पडवळ, घोसाळी, शिराळी इत्यादी फलीभाज्यांवर फलमाशीचा प्रादूर्भाव होण्याची शक्यता आहे, त्याच्या नियंत्रणासाठी “रक्षक” सापले प्रती हेक्टरी ४ नग लावावेत.</li> </ul>
दुधती जनावरे/शेळ्या	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>जनावरांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरवठयाची व्यवस्था करावी.</li> </ul>
सुचना	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>निरनिराळे किडी, रोग जास्त प्रमाणात आढळल्यास नजिकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.</li> </ul>